

3/21 日田間採收及粉碎，到手香原料總重 650KG，陰乾後 3/26 日入料總重 300KG。





室內陰乾過程中失重約 300~350KG

到手香

Plectranthus amboinicus (Lour.)

Cuban oregano, Vick's plant,
Puerto Rican oregano

别名：香茅草屬

别名：到手香

生活型：多年生草本植物

花期：全日照或半日照

栽培季節：台灣平地全年可以繁殖，
以春夏秋季最佳

繁殖方式：扦插繁殖

溫度：不耐冬季低溫4℃以下

土壤條件：排水良好之壤土pH值5.2
-6.5

水分管理：耐旱，不喜高濕度水



斑葉到手香 (*Plectranthus*
"Variegata")



黃斑到手香 (*Plectranthus* West
Indian Wedgeleaf)

植株性狀與生育習性

到手香原產地印度或非洲，歸化遍及東南亞、維京群島、中美洲之墨西哥、西印度群島古巴等，植株是屬於多汁、肥厚的植物，葉肉質、葉緣細鋸齒狀，葉片正反面分布多茸毛，植株高度可以達到1m以上，花密集10或20多朵叢生，花色淡藍紫色。

到手香亦有斑葉品種，鑲邊到手香具有乳白色之葉緣，黃斑到手香其具有乳黃色斑紋分布於葉片中肋附近。

應用

印度用於食物調理。

主要化學成分

精油主要含有carvacrol 80%或thymol 40%及terpinene衍生物。

相關資訊



3/26 日下午蒸餾結束，收油後的精油還是冰的，精油還未熟成。白色部份為植物茸毛。



到手香收油結果，還真是少的可憐啊！